




نام درس: ریاضی ۲
نام دبیر: آقای کشاورز
تاریخ امتحان: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
ساعت امتحان: ۸ صبح / عصر
مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه

جمهوری اسلامی ایران
اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه ۱۲ تهران

سازمان

نام و نام خانوادگی:
مقطع و رشته: یازدهم تجربی
نام پدر:
شماره داوطلب:
تعداد صفحه سؤال: ۲ صفحه

ردیف	سوالات	محل مهر یا امضاء مدیر	نمره
۱	دو خط به معادله های $2x + 3y = 5$ و $ax - 2y = 3$ را در نظر بگیرید. a را طوری بیابید که: (الف) این دو خط با هم موازی باشند. (ب) این دو خط بر هم عمود باشند.		۱
۲	مقدار m را چنان بیابید که مجموع ریشه های معادله ی $2x^2 - (m+1)x - 3m = 0$ برابر با ۳ باشد.		۱
۳	اگر $\frac{a}{5} = \frac{b}{7} = \frac{c}{13}$ ، آنگاه حاصل عبارت $\frac{7a-4b}{2c}$ را به دست آورید.		۰/۵
۴	در شکل زیر، PQ با BC موازی است، مقادیر x و y را محاسبه کنید.		۱
۵	در شکل زیر، مقادیر مجهول را محاسبه کنید.		۱
۶	تابع $f = \{(m^4 + 2, 5), (n^3 + 1, 4)\}$ مفروض است. m و n را طوری تعیین کنید که برد وارون f ، $\{-7, 18\}$ باشد.		۱
۷	اگر تابع خطی f از نقاط $(2, 1)$ و $(4, 5)$ عبور کند، ضابطه ی تابع وارون آن را به دست آورید.		۱
۸	با استفاده از نمودار $f(x) = x $ نمودار تابع $y = 1 - x - 2 $ را رسم کنید.		۰/۵
۹	اگر $\sin \alpha = \frac{-\sqrt{5}}{5}$ و انتهای کمان α در ربع سوم باشد، مقدار $\tan \alpha$ را به دست آورید.		۱
۱۰	مقدار عددی عبارت $\cos(-150^\circ)\cos 420^\circ + \sin 330^\circ\sin 30^\circ$ را به دست آورید.		۱
۱۱	اگر $\frac{\sin(\frac{3\pi}{4} + \alpha)}{2\sin(\alpha - 9\pi) + \cos(\alpha - \frac{5\pi}{4})} = \frac{1}{2}$ ، مقدار $\tan \alpha$ را به دست آورید.		۱
۱۲	هر یک از معادله های زیر را حل کنید. (الف) $2^{2x+1} = 32$ (ب) $9x^{2+2} = (\frac{1}{27})^{2x}$		۱
۱۳	اگر $\log_c a = \frac{3}{4}$ و $\log_c b = \frac{7}{9}$ باشد، مقدار $\log_b a^2 \sqrt{b}$ را بیابید.		۱
۱۴	حاصل عبارت های زیر را به دست آورید. (الف) $2 \log_5 3 - \log_5 x = \log_5 3 + \log_5 9$ (ب) $4(\log_2 \sqrt{5} - \log_2 3)$		۱/۵

ردیف	ادامه ی سوالات	محل مهر یا امضاء مدیر	نمره
۱۵	نمودار تابع f به صورت زیر داده شده است. با توجه به نمودار، حاصل حاصل حدهای خواسته شده را به دست آورید. A) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ B) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ C) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ D) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ 		۱
۱۶	تابع f با ضابطه ی $f(x) = \begin{cases} ax + 1 & ; x > 1 \\ 3x & ; x = 1 \\ bx - 2 & ; x < 1 \end{cases}$ داده شده است. a و b را چنان بیابید که: $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1$ و $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2$		۰/۵
۱۷	حاصل حدهای زیر را به دست آورید. A) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{3x^2 - 13x - 10}{x^2 - 6x + 5}$ B) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\cos^2 x}$		۱
۱۸	مقادیر a و b را طوری تعیین کنید که تابع زیر در نقطه ی $x = 2$ پیوسته باشد. $f(x) = \begin{cases} \frac{x + 2b}{x^2 - 2} & ; x > 2 \\ 2a + x + 1 & ; x = 2 \\ 2b + 5 & ; x < 2 \end{cases}$		۱
۱۹	اگر A و B دو پیشامد مستقل باشند، به طوری که $P(A B) = \frac{1}{3}$ و $P(B) = \frac{1}{3}$، آنگاه $P(A \cup B)$ را بیابید.		۱
۲۰	یک تاس و یک سکه را با هم پرتاب می کنیم: الف) فضای نمونه ای این آزمایش تصادفی را بنویسید. ب) پیشامد A که در آن تاس عدد فرد بیاید را مشخص کنید. ج) پیشامد B که در آن سکه «رو» و تاس عدد کوچکتر از پنج بیاید را مشخص کنید. د) آیا دو پیشامد A و B مستقل اند؟ چرا؟		۱
۲۱	اگر میانگین ده داده ی آماری برابر ۵ و ضریب تغییرات ۳ باشد: الف) واریانس داده ها کدام است؟ ب) اگر دو داده ی ۵ به داده های قبلی اضافه شود، ضریب تغییرات ۱۲ داده را بیابید.		۱



اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه ۱۲ تهران



دبیرستان غیر دولتی دخترانه/پسرانه

کلید سؤالات پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶

نام درس: ریاضی ۲

نام دبیر: آقای کشاورز


تاریخ امتحان: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵

ساعت امتحان: ۸ صبح / عصر

مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه

ردیف	راهنمای تصحیح	محل مهر یا امضاء مدیر
۱	الف) باید شیب های L_1, L_2 با هم برابر باشد تا این دو خط با هم موازی باشند: $L_1: 2x + 3y = 5 \rightarrow 3y = -2x + 5 \rightarrow y = -\frac{2}{3}x + \frac{5}{3} \rightarrow m_1 = -\frac{2}{3}$ $L_2: ax - 2y = 3 \rightarrow -2y = -ax + 3 \rightarrow y = \frac{a}{2}x - \frac{3}{2} \rightarrow m_2 = \frac{a}{2}$ $m_1 = m_2 \rightarrow -\frac{2}{3} = \frac{a}{2} \rightarrow a = -\frac{4}{3}$ ب) باید حاصلضرب شیب های L_1, L_2 برابر (-1) باشد تا این دو خط بر هم عمود باشند: $m_1 \cdot m_2 = -1 \rightarrow \left(-\frac{2}{3}\right)\left(\frac{a}{2}\right) = -1 \rightarrow \frac{a}{3} = 1 \rightarrow a = 3$	
۲	$\alpha + \beta = -\frac{b}{a} \Rightarrow -\frac{-(m+1)}{2} = 3 \Rightarrow \frac{m+1}{2} = 3 \Rightarrow m+1 = 6 \Rightarrow m = 5$	
۳	$\begin{cases} \frac{a}{5} = x \Rightarrow a = 5x \\ \frac{b}{7} = x \Rightarrow b = 7x \\ \frac{c}{13} = x \Rightarrow c = 13x \end{cases} \Rightarrow \frac{7a - 4b}{2c} = \frac{7(5x) - 4(7x)}{2(13x)} = \frac{35x - 28x}{26x} = \frac{7x}{26x} = \frac{7}{26}$	
۴	با توجه به قضیه تالس داریم: $\frac{AP}{BP} = \frac{AQ}{CQ} \Rightarrow \frac{4x}{5} = \frac{20}{x} \Rightarrow 4x^2 = 100 \Rightarrow x^2 = 25 \Rightarrow x = 5$ با توجه به تعمیم قضیه تالس داریم: $\frac{AQ}{AC} = \frac{PQ}{BC} \Rightarrow \frac{20}{20+x} = \frac{x+15}{y-10} \rightarrow \frac{20}{25} = \frac{20}{y-10} \Rightarrow y-10 = 25 \Rightarrow y = 35$	
۵	در مثلث ABC می توان نوشت: $AH^2 = BH \times CH \Rightarrow y^2 = 4 \times 9 \Rightarrow y = 2 \times 3 = 6$ حال با به کار بردن قضیه فیثاغورس در هر دو مثلث قائم الزاویه ی ABH و ACH داریم: $ABH: AB^2 = AH^2 + BH^2 \Rightarrow x^2 = 6^2 + 4^2 \Rightarrow x = \sqrt{52} = \sqrt{4 \times 13} = 2\sqrt{13}$ $ACH: AC^2 = AH^2 + CH^2 \Rightarrow z^2 = 6^2 + 9^2 \Rightarrow z = \sqrt{117}$	
۶	$f = \{(m^4 + 2, 5), (n^3 + 1, 4)\}$ $f^{-1} = f = \{(5, m^4 + 2), (4, n^3 + 1)\} \Rightarrow R_{f^{-1}} = \{m^4 + 2, n^3 + 1\}$ اگر $\{m^4 + 2, n^3 + 1\} = \{-7, 18\}$، از آنجا که $m^4 + 2$ همواره مثبت است باید برابر با ۱۸ و $n^3 + 1$ برابر با (-7) باشد، پس: $\begin{cases} m^4 + 2 = 18 \Rightarrow m^4 = 16 \Rightarrow m = \pm 2 \\ n^3 + 1 = -7 \Rightarrow n^3 = -8 \Rightarrow n^3 = (-2)^3 \Rightarrow n = -2 \end{cases}$	

$$\begin{aligned} \{(2,1) \in f \\ \{(4,5) \in f \rightarrow y-1 &= \frac{5-1}{4-2}(x-2) \Rightarrow y=f(x)=2x-3 \\ y=2x-3 \Rightarrow y+3 &= 2x \Rightarrow x=\frac{y+3}{2} \rightarrow y=\frac{x+3}{2} \Rightarrow f^{-1}(x)=\frac{x+3}{2} \end{aligned}$$



در ربع سوم: $\sin \alpha < 0, \cos \alpha < 0$

$$\begin{aligned} \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \rightarrow \left(-\frac{\sqrt{5}}{5}\right)^2 + \cos^2 \alpha = 1 \rightarrow \cos^2 \alpha = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5} \rightarrow \cos \alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}} = -\frac{2\sqrt{5}}{5} \\ \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{-\frac{\sqrt{5}}{5}}{-\frac{2\sqrt{5}}{5}} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos(-\alpha) &= \cos \alpha \\ \cos 150^\circ &= \cos(180^\circ - 30^\circ) \rightarrow \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha \rightarrow -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \cos 42^\circ &= \cos(36^\circ + 6^\circ) \rightarrow \cos(36^\circ + \alpha) = \cos \alpha \rightarrow \cos 6^\circ = \frac{1}{2} \\ \sin 33^\circ &= \sin(36^\circ - 3^\circ) \rightarrow \sin(36^\circ - \alpha) = -\sin \alpha \rightarrow -\sin 3^\circ = -\frac{1}{2} \\ \sin 30^\circ &= \sin(36^\circ - 6^\circ) \rightarrow \sin(36^\circ - \alpha) = -\sin \alpha \rightarrow -\sin 6^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \cos(-150^\circ)\cos 42^\circ + \sin 33^\circ \sin 30^\circ &= \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \times \frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right) \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 0 \end{aligned}$$

ابتدا هر یک از نسبت های مثلثاتی داده شده را بر حسب نسبت های مثلثاتی کمان α می نویسیم:

$$\begin{aligned} \sin\left(\frac{3\pi}{4} + \alpha\right) &= \sin\left(\pi + \frac{\pi}{4} + \alpha\right) = -\cos \alpha \\ \sin(\alpha - 9\pi) &= -\sin(9\pi - \alpha) = -\sin \alpha \\ \cos\left(\alpha - \frac{5\pi}{4}\right) &= \cos\left(\frac{5\pi}{4} - \alpha\right) = \sin \alpha \\ \frac{\sin\left(\frac{3\pi}{4} + \alpha\right)}{2\sin(\alpha - 9\pi) + \cos\left(\alpha - \frac{5\pi}{4}\right)} &= \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{-\cos \alpha}{2 \times (-\sin \alpha) + \sin \alpha} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{-\cos \alpha}{-\sin \alpha} = \frac{1}{2} \Rightarrow \cot \alpha = \frac{1}{2} \\ \cot &= \frac{1}{\tan} \Rightarrow \frac{1}{\tan \alpha} = \frac{1}{2} \Rightarrow \tan \alpha = 2 \end{aligned}$$

$$\text{الف) } 2^{2x+1} = 32 \Rightarrow 2^{2x+1} = 2^5 \Rightarrow 2x+1 = 5 \Rightarrow x = 2$$

$$\text{ب) } 9^{x^2+2} = \left(\frac{1}{27}\right)^{2x} \Rightarrow (3^2)^{x^2+2} = (3^{-3})^{2x} \Rightarrow 3^{2x^2+4} = 3^{-6x} \Rightarrow 2x^2 + 4 = -6x$$

$$2x^2 + 6x + 4 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = -2 \end{cases}$$

۱۳	با استفاده از ویژگی تغییر مبنا $\log_b a = \frac{\log_c a}{\log_c b}$ داریم: $\log_{b^r} a^r \sqrt{b} = \frac{\log_c a^r \sqrt{b}}{\log_c b^r} = \frac{\log_c a^r + \log_c \sqrt{b}}{r \log_c b} = \frac{r \log_c a + \frac{1}{r} \log_c b}{r \log_c b} = \frac{r(\frac{r}{r}) + \frac{1}{r}(\frac{r}{r})}{r(\frac{r}{r})} = \frac{17}{21}$
۱۴	الف) $2 \log_{\Delta} 3 - \log_{\Delta} x = \log_{\Delta} 3 + \log_{\Delta} 9$ $\Rightarrow 2 \log_{\Delta} 3 - \log_{\Delta} 3 - \log_{\Delta} 9 = \log_{\Delta} x \Rightarrow \log_{\Delta} 3 - \log_{\Delta} 9 = \log_{\Delta} x \Rightarrow \log_{\Delta} \frac{3}{9} = \log_{\Delta} x \Rightarrow x = \frac{1}{3}$ ب) $4(\log_r \sqrt{5} - \log_r 3) = (r^2)(\log_r \sqrt{5} - \log_r 3) = r^2(\log_r \frac{\sqrt{5}}{3}) = r^{\log_r (\frac{\sqrt{5}}{3})^r} = (\frac{\sqrt{5}}{3})^r = \frac{5}{9}$
۱۵	A) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2$ B) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1$ C) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ حد ندارد D) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$ وجود ندارد
۱۶	$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (ax + 1) = a(1) + 1 = 2 \Rightarrow a = 1$ $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (bx - 2) = b(1) - 2 = 1 \Rightarrow b = 3$
۱۷	A) $\lim_{x \rightarrow \Delta} \frac{rx^r - 13x - 10}{x^r - 6x + \Delta} = \lim_{x \rightarrow \Delta} \frac{(rx + 2)(x - \Delta)}{(x - 1)(x - \Delta)} = \frac{r(\Delta) + 2}{\Delta - 1} = \frac{17}{4}$ B) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{r}} \frac{1 - \sin x}{\cos^r x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{r}} \frac{1 - \sin x}{(1 - \sin x)(1 + \sin x)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{r}} \frac{1}{1 + \sin x} = \frac{1}{2}$
۱۸	$f(r) = 2a + 2 + 1 = 2a + 3$ $\lim_{x \rightarrow r^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow r^+} \frac{x + 2b}{x^r - 2} = \frac{r + 2b}{r} = b + 1$ $\lim_{x \rightarrow r^-} f(x) = 2b + 5$ $2a + 3 = b + 1 = 2b + 5 \Rightarrow b + 1 = 2b + 5 \Rightarrow b = -4$ $2a + 3 = 2b + 5 \Rightarrow 2a + 3 = -3 \Rightarrow a = -3$
۱۹	دو پیشامد مستقل: $P(A B) = P(A) = \frac{1}{3}$ $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ $P(A \cup B) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{9} = \frac{5}{9}$
۲۰	الف) $S = \{(1, r), (2, r), (3, r), (4, r), (5, r), (6, r), (1, p), (2, p), (3, p), (4, p), (5, p), (6, p)\}$ ب) $A = \{(1, r), (3, r), (5, r), (1, p), (3, p), (5, p)\}$ ج) $B = \{(1, r), (2, r), (3, r), (4, r)\}$ د) $P(A) = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ $A \cap B = \{(1, r), (3, r)\} \Rightarrow P(A \cap B) = \frac{n(A \cap B)}{n(S)} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$ $\begin{cases} P(A \cap B) = \frac{1}{6} \\ P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \end{cases} \Rightarrow A \text{ و } B \text{ دو پیشامد مستقل از هم اند}$

$$cv = \frac{\sigma}{\bar{X}} \rightarrow 3 = \frac{\sigma}{5} \rightarrow \sigma = 15$$

ب) مجموع ۱۰ داده‌ی اولیه را حساب می کنیم:

$$\bar{X} = \frac{x_1 + \dots + x_{10}}{10} \rightarrow 5 = \frac{x_1 + \dots + x_{10}}{10} \rightarrow x_1 + \dots + x_{10} = 50$$

حال با دو داده‌ی ۵ محاسبه می کنیم:

$$\bar{X}' = \frac{x_1 + \dots + x_{10} + 5 + 5}{12} \rightarrow \bar{X}' = \frac{50 + 5 + 5}{12} = 5$$

حال رابطه‌ی انحراف معیار را برای ۱۰ داده‌ی اولیه می نویسیم:

$$\sigma = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{X})^2 + \dots + (x_{10} - \bar{X})^2}{10}} \rightarrow 15 = \sqrt{\frac{(x_1 - 5)^2 + \dots + (x_{10} - 5)^2}{10}} = 2250$$

رابطه‌ی انحراف معیار را برای ۱۲ داده‌ی جدید می نویسیم:

$$\sigma' = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{X})^2 + \dots + (x_{10} - \bar{X})^2 + (5 - \bar{X})^2 + (5 - \bar{X})^2}{12}} \rightarrow \sigma' = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{X})^2 + \dots + (x_{10} - \bar{X})^2 + 0 + 0}{12}}$$

$$\sigma' = \sqrt{\frac{2250}{12}} = \sqrt{187.5}$$

رابطه‌ی ضریب تغییرات را می نویسیم:

$$cv' = \frac{\sigma'}{\bar{X}'} = \frac{\sqrt{187.5}}{5}$$

امضاء:

نام و نام خانوادگی مصحح: امید کشاورز

جمع بارم: ۲۰